

Synopse zur Unterscheidung der heimischen Wildrosen Norddeutschlands von Dr. Heinz Henker (Neukloster)

		Hundsrosen (<i>R. canina</i> -Gruppe)			Weinrosen (<i>R. rubiginosa</i> -Gruppe)		Filzrosen (<i>R. tomentosa</i> -Gruppe)				
		Stacheln									
		hakig			hakig		sichelig	gerade			
		Blätter									
		drüsenlos bis schwach drüsig (Rhachis und Blätter unterseits)			klebrig-drüsig und mit Apfelduft, Blattgrund		Blätter (auch oberseits) samtig bis stark filzig behaart, drüsig (Stieldrüsen), mit Terpentinduft				
		unbehaart	behaart	drüsig und behaart	+/- keilförmig (unterste Fiederblättchen ansehen)	+/- abgerundet					
Griffelkanal	weit, über 1mm	<i>R. dumalis</i> (= <i>R. vosagiaca</i>)	<i>R. caesia</i>		<i>R. elliptica</i>	<i>R. rubiginosa</i> (ssp. <i>rubiginosa</i> , <i>umbellata</i> , <i>columnifera</i>) (Kelchblatthaltung variabel)	<i>R. sherardii</i>	<i>R. villosa</i> , <i>R. mollis</i>	aufgerichtet, spät abfallend (mit oder nach der der Buttenreife) oder ausdauernd		
	unterschiedlich, um 1mm	<i>R. subcanina</i>	<i>R. subcollina</i>		<i>R. inodora</i>		<i>R. pseudo-scabriuscula</i>		+/- flatterig, früher oder später abfallend (meist zur Buttenreife)		
	eng, unter 1mm	<i>R. canina</i> (aufgewölbter Diskus)	<i>R. corimbifera</i> (var. <i>corymbifera</i> , var. <i>deseglesii</i>), (aufgewölbter Diskus)	<i>R. tomentella</i> (= <i>R. obtusifolia</i>)	<i>R. agrestis</i> (kleine Früchte, schmalblättrig)	<i>R. micrantha</i> (Fruchtsiel drüsig, Frucht birnenförmig)	<i>R. tomentosa</i>			streng zurückgeschlagen und früh abfallend (vor der Buttenreife)	